



© René Dumoulin
<http://www.oiseaux.net/oiseaux/columbiformes/images/pigeon.colombin.redu.1g.jpg>

Systematique :

Columba oenas

(Linnaeus, 1758)

Règne : Animalia

Embranchement : Chordata

Sous-embranchement :

Gnathostomata

Classe : Aves

Sous-classe : Passerae

Super-ordre : Columbimorphae

Ordre : Columbiformes

Sous-ordre : Alcedini

Famille : Alcedinidae

Nom français : Pigeon colombin

Espèce réglementée

Source INPN

 **Protection**

Communautaire :

Directive Oiseaux : Annexe II/2

International :

Convention de Berne : Annexe III

De portée nationale :

Oiseaux protégés : Article 5

D'après le site « <http://www.oiseaux.net/oiseaux/pigeon.colombin.html> »

Description

Forestier, discret. Niche dans les trous des arbres dans les grandes forêts (notamment les loges du pic noir), parfois sur les bâtiments. Recherche sa nourriture (graines, jeunes pousses) dans des espaces découverts à végétation rase. La femelle couve seule ses deux oeufs, et entame parfois une deuxième couvée avant même le départ de la première. Plutôt sédentaire.

Habitat, moeurs et reproduction

Le pigeon colombin préfère les bois non exploités de *feuillus* ou d'essences mixtes, mais s'installe aussi parfois dans les grands parcs. Cependant, il n'est pas limité aux bois et aux cultures : il apprécie les falaises, les flancs de montagne et les à-pics plutôt dans les terres que sur la côte, occupant des carrières et s'envolant bruyamment si on le dérange. Il est typique des fermes très arborées de plaines et de lisières de bois, surtout quand il peut nicher dans les gros trous de vieux arbres. L'*abattage* des vieux arbres renfermant des cavités est probablement la cause principale de sa régression partout sur son *aire* de répartition. Celle-ci couvre l'ensemble de l'Europe, excepté l'extrême nord et la Grèce, et s'étend à travers l'Asie-Mineure, l'Asie Centrale et la Sibérie Occidentale.

Chant

Le Pigeon colombin caracoule, jabotte, roucoule. Son *chant* répété est typique, plus grave et plus simple que celui du pigeon ramier : 'hououôu-ouh' ou 'hououôuôu-ir', rythmé et retentissant.

Comportement

Après la saison de reproduction, il se mêle souvent aux pigeons ramiers, aux corbeaux freux et aux choucas des tours. Les espèces vivant en Europe Occidentale sont sédentaires alors que les populations du nord et de l'est migrent à l'ouest et au sud..

Régime

Il picore surtout des graines, des feuilles, des tiges et des bourgeons sur le sol, en marchant lentement ou à l'arrêt. Il préfère les terrains plus ou moins dénudés et s'alimente près de l'eau (pour s'abreuver souvent) ou dans les arbres

Vol

Le pigeon colombin à un vol battu avec des claquements d'ailes sonore. En vol nuptial, il a les ailes relevées en V.

Protections et Menaces

Chasse de l'homme : prélèvement estimé à 50 000-100 000 oiseaux en 1983-1984, la majorité dans le sud-ouest, pratiques sylvicoles (plantation résineux, abattage des vieux arbres creux, disparition des arbres têtards), comblement des trous de murs et d'arbres en milieu urbain.