



Image © Valdemar Verissimo

Systematique :

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Sous-embranchement : Gnathostomata
Classe : Mammalia
Sous-classe : Eutheria
Ordre : Chiroptera
Sous-ordre : Microchiroptera
Famille : Vespertilionidae
Nom français : Pipistrelle de Kuhl

Espèce réglementée
Source INPN

Protection

Communautaire :

Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV

International :

Convention de Berne : Annexe II

Convention de Bonn : Annexe II

National :

Mammifères protégés : Article 2

D'après le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » (Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE) et le site

« http://www.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/faune_forestiere/chauves_souris/vespertilionides/20071211-151748-447618/@@index.html »

Description

Espèce de petite taille avec un large liseré blanc sur le bord libre des ailes.

Comme chez les autres pipistrelles, les oreilles sont petites, triangulaires, arrondies au bout, avec un tragus incurvé vers l'intérieur.

La couleur du poil est brune, alors que les oreilles, le patagium, et le museau sont brun foncé à brun-noir.

Habitat, mœurs et reproduction

Espèce anthropophile, la Pipistrelle de Kuhl se rencontre aussi dans les paysages karstiques. Elle apprécie les plaines et les vallées de montagne.

Les colonies sont surtout dans les fissures des bâtiments, parfois dans les fentes des rochers (où se trouvent les quartiers d'hiver).

Comportement

L'espèce est mal connue.

Après une maturité sexuelle dans la première année, les femelles se rassemblent au printemps pour former des petites colonies d'une vingtaines d'individus.

Elles mettent bas un ou deux petits.

Régime

Elle sort à la tombée de la nuit pour chasser autour des lampadaires, au dessus de l'eau et des jardins.

De son vol rapide et agile, elle capture des petits diptères, des papillons, des trichoptères et des punaises.