



ALTHIS

Liste rouge de l'UICN – statut NT

## Systematique :

*Hyla arborea*  
(Linnaeus, 1758)

**Règne :** Animalia

**Embranchement :** Chordata

**Sous-embranchement :** Gnathostomata

**Classe :** Amphibia

**Ordre :** Anura

**Famille :** Hylidae

**Nom français :** Rainette verte

### Espèce réglementée

Source INPN

#### **Protection**

##### Communautaire :

Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV

##### International :

Convention de Berne : Annexe II

##### National :

Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2

D'après les sites « [http://www.herpfrance.com/fr/amphibien/rainette\\_verte\\_hyla\\_arborea.php](http://www.herpfrance.com/fr/amphibien/rainette_verte_hyla_arborea.php) » et  
« [http://www.herpfrance.com/fr/amphibien/rainette\\_verte\\_hyla\\_arborea.php](http://www.herpfrance.com/fr/amphibien/rainette_verte_hyla_arborea.php) »

#### **Description**

Il s'agit d'une petite grenouille, qui ne dépasse pas 5 cm de long, à la peau lisse, verte, au ventre gris et présentant une bande brune de l'œil aux flancs. Elle possède des pelotes adhésives au bout des phalanges lui permettant de grimper aux arbres.

Les têtards mesurent environ 40 mm de long. Ils sont gris ou parfois en fin de développement deviennent vert, leur queue monte sur le dos. Les Imago sont identiques aux adultes.

Les adultes sont uniformes vert vif avec une ligne noir qui va du nez en passant vers les yeux, sur les flancs et se termine à l'avant des pattes arrières. Leur ventre est blanc. Les mâles se distinguent facilement en saison de reproduction grâce à leur petite taille mais aussi à leur gorge de couleur jaune/orange/marron.

#### **Habitat et reproduction**

Les Rainettes vertes se rencontrent dans les milieux marécageux et boisés à proximité de l'eau. On peut en apercevoir sur des branches de plantes exposées au soleil.

La période de reproduction a lieu au printemps de mars à juin, l'accouplement se produit la nuit. Le mâle saute sur le dos de la femelle et prend appui avec ses pattes avant et son menton collé sur son cou. Quand la femelle se déplace le mâle s'accroche pour être porté.

Les femelles pondent de 800 à 1000 œufs en masses flottantes, mesurant environ 1.5 à 2 mm de diamètre. Les lieux de reproduction sont des trous d'eau peu profond avec beaucoup de végétation et peu de courant, des étangs, champs inondés, mares...

#### **Mœurs et comportement**

Les Rainettes sont les seuls amphibiens européens à mœurs arboricoles.

Elles ont une activité nocturne, tandis qu'elles passent la journée, lorsque celle-ci est bien ensoleillée, immobiles plusieurs heures afin de prendre le soleil.

C'est une espèce bruyante, et les mâles forment des chœurs nocturnes sonores caractéristiques.

Elles hibernent à terre dans des trous ou des fissures des racines d'arbres. La sécrétion de la peau aide à la défendre contre les prédateurs, et fait mal si cela entre en contact avec les yeux.

#### **Régime**

Leur régime est composé en particulier d'insectes volants.