



Salamandra salamandra (terrestris)
(photo ALTHIS)

Systematique :

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Règne : Animalia

Embranchement : Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Urodela

Famille : Salamandridae

Nom français : Salamandre tachetée

Espèce réglementée

International :

Convention de Berne : Annexe III

De portée nationale :

Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3
Source INPN

D'après « le guide herpéto », Arnold et Ovenden, 2002, avec compléments Althis

Description

Grosse salamandre qui peut faire jusqu'à 20 cms à la queue relativement courte et aux glandes parotoïdes proéminentes. Pratiquement la seule espèce européenne au dos marqué de tâches ou bandes jaunes, orange ou rouge vif sur fond noir. Ventre pouvant être entièrement noir ou tacheté de jaune pâle.

Il existe de grandes variations de coloration et de proportions dans les populations européennes. En France, les tâches jaunes forment 2 bandes dorsales pointillées (*S. s. terrestris*).

Habitat, mœurs et reproduction

Sur la majeure partie de son aire de répartition, elle se rencontre dans les forêts humides et fraîches de feuillus et plus rarement dans les forêts de résineux. Elle est presque toujours terrestre, mais aime les contextes humides et rarement très éloignée de l'eau. Elle est surtout nocturne et fréquemment active après les pluies.

Lorsque inactive, elle réside principalement sous des souches, écorces mortes ou pierres et peut même s'enterrer.

Dans le Morbihan, on trouve souvent des juvéniles dans les fontaines.

La gestation dure environ 6 à 8 mois et les femelles donnent ainsi naissance entre 8 et 70 larves de 2,5 à 3,5 cm de long, généralement déposées dans les cours d'eau frais et propres. Les larves vivent principalement au fond où elles peuvent passer l'hiver, bien que sa métamorphose se déroule dans les 2 à 4 mois. La maturité sexuelle est atteinte entre 2 à 4 ans.



Larves de Salamandre tachetée (56)
Photo R.Criou (2007)