

***Erica tetralix***Bruyère à quatre angles  
ERICACÉES

© ALTHIS

**ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC**

- Sous-arbrisseau de 30-80 centimètres ; phanérophYTE ou chamæphyte, sempervirente.
- Tige dressée tortueuse. Jeunes rameaux **pubescents**, souvent velus-glanduleux, s'enracinant à la base.
- Feuilles en petites aiguilles, coriaces, **verticillées par 4**, ovales-aiguës, longues de 4 mm., **hérissées de cils, blanches** dessous.
- **Bouquet terminal** : Grappe condensée en **tête ombelliforme penchée, de 4-12 fleurs rose pâle**. Fleurs à pédoncules plus courts que les fleurs, régulières, velus-blanchâtres, étamines cachées par la corolle. Calice à lobes lancéolés longuement **ciliés** (environ. 4 fois plus courts que la corolle). Celle-ci en grelot ovale (5-7 mm.), un peu renflée au milieu et courbée au sommet, à dents très courtes et réfléchies. Anthères incluses munies de deux cornes à la base. Style légèrement saillant. Capsule velue-soyeuse.
- **Floraison** : **mai à octobre**.


**HABITAT-ÉCOLOGIE**[44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes](#), [31.1 Landes humides](#).

Landes et pâturages humides ou tourbeuses, bois humides et clairs, marais, tourbières, bords des fossés.

- **Caractère indicateur** : **Hygrophile stricte** ; acidiphile ; héliophile.

**REPARTITION dans le département du Morbihan**

Assez commune, sauf région maritime, mais en régression.

Erica tetralix  
Bruyère à quatre angles

(RIVIERE G. 2007. p387)