

***Calluna vulgaris***

Callune, Bruyère commune

ERICACÉES



© ALTHIS

**ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC**

- **Sous-arbrisseau de 80 cm maximum**, formant des tapis ; glabre, tortueux, diffus, à **rameaux nombreux**, effilés, dressés, **rougeâtres**.
- Feuilles petites, opposées, **densément imbriquées sur 4 rangs**, à 2 pointes à la base.
- **Fleurs pourpre pâle à rose lilas**, 3-4 mm, brièvement pédonculées, penchées, en grappes minces et lâches ; sépales pétaloïdes, muni à la base de bractées vertes, à 4 lobes oblongs et plus longs que les pétales ; corolle marcescente, en cloche, à 4 lobes, 8 étamines, incluses ;
- **Floraison : juillet à octobre**.

**HABITAT-ÉCOLOGIE****31.1 Landes humides.**

Landes, lisières, talus, bois et coteaux arides.

- **Caractère indicateur** : landes atlantiques thermophiles ; hyperacidophile ; hyperoligotrophile ; héliophile.

Calluna vulgaris  
Callune commune, C. fausse-bruyère**REPARTITION dans le département du Morbihan**

Très commune.



(RIVIERE G. 2007. p389)

