



Cirsium palustre

Cirse des marais

ASTERACÉES (Composées)



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Plante bisannuelle de 1,20 m maximum, dressée.
- **Tige ailée et épineuse sur toute la longueur**, presque simple, **ramifiée dans le haut, pubescente**.
- Feuilles lancéolées étroites, **très épineuses, poilues en-dessous**.
- **Capitule pourpre** (parfois blanc) ; **en groupes de 2 à 8** ; bractées florales érigées, peu épineuses et tachées de pourpre.
- **Floraison : juillet à septembre**.

HABITAT-ÉCOLOGIE


[44.92 Saussaie marécageuse](#), [53.21 Peuplements de grandes Laïches](#), [37.1 Communautés à Reine des prés](#), [37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques](#), [37.241 Pâtures à grand Jonc](#), [37.25 Prairies de transition à hautes herbes](#), [37.7 Lisières humides à grandes herbes](#).

Prairies et bois humides à marécageuses, fossés, tourbières, marécages, bords des routes.

- **Caractère indicateur : hydrophile** (longuement inondable de bas-niveau topographique) ; acidocline (pH<5,5) ; héliophile.

REPARTITION dans le département du Morbihan

Très commun.



(RIVIERE G. 2007. p475)