



***Stachys sylvatica***  
Épiaire des bois  
LAMIACÉES (Labiées)

Sans même l'écraser, on peut sentir une odeur désagréable, fétide !



© ALTHIS

### ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Plante vivace assez grande, jusqu'à 1 mètre, très velue, verte, à souche rampante.
- Tige érigée à poils glanduleux.
- Feuilles poilues, longuement pétiolées, largement ovales-acuminées, en cœur à la base, fortement dentées.
- Fleurs poilues, pourpre foncé avec des marques blanches, 3 à 6 en verticilles presque tous écartés, absentes à la base ; calice en cloche, hérissé de poils et de glandes, avec des dents égales.
- **Floraison : juin à septembre.**

### HABITAT-ÉCOLOGIE

[44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes](#), [87 Terrains en friche et terrains vagues](#).

Bois frais, haies, lisières des terrains cultivés.


- **Caractère indicateur : hygrophile** (courtement inondable de niveau topographique moyen) ; nitrophile ; hémisciaphile.

S'hybride avec *Stachys palustris* pour former *Stachys x ambigua*, un hybride envahissant.

### REPARTITION dans le département du Morbihan

Commune.

*Stachys sylvatica*  
Épiaire des bois



(RIVIERE G. 2007. p419)