



***Stachys palustris***  
Épiaire des marais  
LAMIACÉES (Labiées)



© ALTHIS

**ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC**

- Grande vivace jusqu'à 2 mètres (maximum), **velue**, verte, à souche longuement rampante.
- Tige dressée, simple ou peu rameuse.
- Feuilles sessiles ou courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës, arrondies ou un peu en cœur à la base, dentées, finement pubescentes.
- Fleurs roses à pourpres, légèrement poilues, 4 à 8 en verticilles en épi dense, interrompu à la base. Seules les bractées inférieures ont la forme d'une feuille ; calice velu mais sans glandes.
- **Floraison : juin à octobre.**

**HABITAT-ÉCOLOGIE**

[37.1 Communautés à Reine des prés](#), [37.7 Lisières humides à grandes herbes](#), [87 Terrains en friche et terrains vagues](#).  
Marais, bordures des eaux, terrains cultivés.


■ **Caractère indicateur : hygrophile.**

S'hybride avec *Stachys sylvatica* pour former *Stachys x ambigua*, un hybride envahissant.

*Stachys palustris*  
Épiaire des marais

**REPARTITION dans le département du Morbihan**

Répartition calquée sur le réseau fluvial principal.  
Assez commune.



(RIVIERE G. 2007. p419)

48 45.7 % AC