

***Fraxinus excelsior***

Frêne commun

OLEACÉES



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Arbre élevé, **très polymorphe**. Jusqu'à 40 m de haut, cime large et étalée.
- Ecorce lisse et gris brun au départ puis parcourue de profondes crevasses s'accroissant avec l'âge.
- Tige aplatie aux nœuds avec de **gros bourgeons noirs** en hiver.
- Feuilles à 7-13 folioles ovales de 5 à 11 cm de long, pointues, dentées en scie, glabres et vertes en dessus, plus pâles et pubescentes près de la côte en dessous.
- Fleurs brunâtres (pourpres ou noirâtres), sans pétales et sépales, réunies en grappes terminales ou latérales.
- Fruits : samare plate protégée par une aile allongée (en forme de langue), brun pâle à maturité, en bouquet tombant.
- **Floraison** : avril à mai.

HABITAT-ÉCOLOGIE


[44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes](#), [44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes](#), [44.1 Formation riveraine de saules](#).

Dépressions humides, bois humides, bords des cours d'eau, sur sols riches.

- Espèce héliophile.

REPARTITION dans le département du Morbihan

Très commun mais souvent localisé, fait l'objet de plantation.



(RIVIERE G. 2007. p)