



Juncus acutiflorus
Jonc acutiflore
JONCACÉES



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Plante vivace de maximum 1 m, glabre, à **rhizomes longuement traçants**.
- Tiges dressées, un peu comprimées, feuillées.
- Feuilles écartées, cylindriques-comprimées, par groupe de 3 **avec des cloisons pour l'une d'entre elles**.
- **Fleurs brun fauve**, petites, **glomérulées par 5-8**, en panicule ordinairement étalée.
Tépales acuminés ; 6 étamines, à anthères plus longues que le filet ; capsule d'un brun roussâtre, longuement atténuée en bec, dépassant le périanthe.
- **Floraison : juin à août**.

HABITAT-ÉCOLOGIE

[37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques](#), [37.25 Prairies de transition à hautes herbes](#), [82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé](#), [87 Terrains en friche et terrains vagues](#).

Marais, prairies humides et prés tourbeux.


- **Caractère indicateur : Hydrophile** (longuement inondable de bas-niveau topographique) ; **acidophile** ; hyperhéliophile.

S'hybride avec *Juncus articulatus* pour former *Juncus x suurejanus*.

REPARTITION dans le département du Morbihan

Très répandu.

Juncus acutiflorus
Jonc à fleurs aiguës, J. des bois



(RIVIERE G. 2007. p513)

94 89,5 % TC