

**Carex spp.**

Laîche

CYPERACÉES



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Presque toutes vivaces.
- Tige généralement **triangulaire**, parfois cylindrique.
- Feuilles raides, râpeuses lorsqu'on glisse la main de la pointe vers le bas. Attention de ne pas se couper !
- Une première distinction entre les espèces peut se faire sur **l'aspect des Carex** : touffes épaisses ? Longs rhizomes ? Feuilles fines, larges ? Gaine entourant les feuilles ?
- Les fleurs se trouvent à **l'aisselle d'une bractée** (écaille) et sont groupées **en épillet** qui comporte une seule fleur mâle ou femelle. Souvent séparés on retrouve les épis mâles en haut de l'inflorescence, au-dessus.
- Les fruits peuvent être importants pour la détermination des espèces, **leur forme, leur couleur ainsi que celles des bractées** sont également des critères importants.

HABITAT-ÉCOLOGIE

[44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes](#), [44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes](#), [53.21 Peuplements de grandes Laîches](#).

Les Cypéracées croissent lentement.

- **Caractère indicateur : Milieux pauvres et gorgés d'eau.**

REPARTITION dans le département du Morbihan

Genre qui contient le plus d'espèces dans ce département, plus de 40.

(RIVIERE G. 2007. p565 à 577)