



Populus nigra
Peuplier noir
SALICACÉES



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Arbre élevé (30 m maximum) aux **rameaux étalés et arrondis, houppier ample**.
- Tronc massif, plus ou moins bosselé à l'**écorce gris foncé avec de grands renflements**.
- **Bourgeons collants** et **jeunes pousses glabres et très visqueux**. Tiges glabres, jaunâtres devenant grisâtre.
- Feuilles ovales à triangulaires, **finement dentées, longuement pétiolé** et se terminant par une **pointe**. Très glabres, vertes et luisantes sur les deux faces, pétiole comprimé au sommet.
- Fleurs en forme de **chatons pendants**, mâles à anthères rouges, femelles vertes.
- Chatons fructifères à écailles glabres.
- Fruits : capsules vertes à petites graines cotonneuses.

Floraison : mars à avril.

HABITAT-ÉCOLOGIE

[44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes](#), [44.1 Formation riveraine de saules](#).

Fréquemment cultivé.

Fonds de vallée, bois humides et marécageux, bordures de cours d'eau, d'étangs.

REPARTITION dans le département du Morbihan

Commun.

(RIVIERE G. 2007. p231)